



# Hiperpros T<sup>®</sup>

CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

Tamsulosina HCL 0.4 mg

## Hiperplasia Prostática Benigna

La Hiperplasia prostática benigna (HPB) es el aumento del número y el tamaño de células prostáticas de la zona transicional (el cáncer ocurre en la zona periférica)

### Etiología

Los andrógenos son fundamentales, la HPB no se observa en prepúberes, cuando estos son bajos, pero si ocurre durante el periodo postpuberal cuando los niveles de andrógenos están elevados.

5-alfa-reductasa


Testosterona

Dehidrotestosterona


Hiperplasia  
Prostática  
Benigna



# Epidemiología



- 20% en hombres de 40 y 50 años
- 50% en hombres de 50 a 60 años
- Mas de 90% en hombres mayores a 90 años



## Factores de riesgo

Edad mayor a 55 años, síndrome metabólico, ingesta de café, raza negra y antecedentes familiares. La ingesta de cítricos es un factor protector




**Hiperpros T<sup>®</sup>**

CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

# Cuadro Clínico

La HPB produce un crecimiento prostático benigno (CPB) que, a su vez, provoca una obstrucción prostática benigna (OPB) y una obstrucción de la salida de la vejiga, lo que provoca síntomas del tracto urinario inferior asociados a HPB (STUI/HPB) y se evalúan con el puntaje internacional de síntomas prostáticos

## Síntomas de almacenamiento



Frecuencia, nicturia, urgencia e incontinencia

## Síntomas obstructivos



Chorro débil, pujo, intermitencia

## Síntomas postmiccionales



Goteo y sensación de vaciado incompleto

# Hiperpros T<sup>®</sup>

Tamsulosina HCL 0.4 mg

CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA

**TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN EN  
HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA**